

## 中西医外科学

## 刷题直播

主讲：江行桐

在执业医师考试中，出题约 40 道，在执业助理医师考试中，出题约 20 道。本科目各章节在考试中均有考题出现，其中重点考查的章节有**中医外科证治概要、输血、外科感染、急腹症、乳腺疾病、泌尿及男科生殖系统疾病、肛门直肠疾病等**。本科目的特点是：**中医外治特色明显，西医考点集中**，方剂相对有规律。

## 【A1 型题】

1. 饮食不洁同时感受外邪易发生
  - A. 疡
  - B. 疔
  - C. 漏
  - D. 痰
  - E. 岩
  
2. 致病特点为其肿宣浮，患部皮色或红或不变，痛无定处，走注甚速的是
  - A. 风
  - B. 寒
  - C. 暑
  - D. 湿
  - E. 燥
  
3. 火邪致病的特点是
  - A. 其肿宣浮，患部皮色红，痛无定处，走注甚速
  - B. 多为阳证，患部焮红、肿胀、灼热，糜烂流脓，其痛遇冷则减
  - C. 发病迅速，来势猛急，焮红灼热，肿处皮薄光亮，疼痛剧烈，容易化脓腐烂
  - D. 多为色紫青暗，不红不热，肿势散漫，痛有定处，得暖则减，化脓迟缓
  - E. 易伤人体阴液，侵犯皮肤，致患部干燥、枯槁、皲裂、脱屑
  
4. 外科疾病总的发病机理是
  - A. 局部气血凝滞，郁久化热，热盛肉腐
  - B. 体内的气血、经络、脏腑功能失调
  - C. 脾胃功能失调，湿热火毒内生
  - D. 局部的气血凝滞，营气不从，经络阻塞，以致脏腑功能失和
  - E. 脏腑气血受损，阴阳失和，使正气亏损
  
5. 肿疡、溃疡的通用方为
  - A. 红灵丹
  - B. 太乙膏
  - C. 冲和膏
  - D. 回阳玉龙膏
  - E. 生肌玉红膏

**【知识拓展】**

## 1. 膏药

适应证：一切外科疾病初起、成脓、溃后各个阶段。

用法：太乙膏、千捶膏均可用于红肿热痛明显之阳证疮疡，为肿疡、溃疡的通用方。

## 2. 油膏

适应证：适用于肿疡、溃疡、皮肤病糜烂结痂渗液不多者，以及肛门病等。

用法：肿疡期用金黄膏、玉露膏清热解毒、消肿止痛、散瘀化痰，适用于疮疡阳证。回阳玉龙膏有温经散寒、活血化瘀的作用，适用于阴证。溃疡期可选用生肌玉红膏、红油膏、生肌白玉膏。

## 3. 箍围药

适应证：凡外疡不论初起、成脓及溃后，肿势散漫不聚而无集中之硬块者。

用法：金黄散、玉露散可用于红肿热痛明显的阳证疮疡；疮形肿而不高，痛而不甚，微红微热，属半阴半阳证者，可用冲和膏；疮形不红不热、漫肿无头，属阴证者，可用回阳玉龙膏。

## 4. 草药

适应证：一切外科疾病之阳证，具有红肿热痛者；创伤浅表出血；皮肤病的止痒；毒蛇咬伤等。

用法：蒲公英、紫花地丁、马齿苋、芙蓉花叶、七叶一枝花、丝瓜叶等，有清热解毒消肿之功，适用于阳证肿疡。

## 5. 掺药

(1) 消散药：适用于肿疡初起而肿势局限尚未成脓者。阳证用阳毒内消散、红灵丹；阴证用阴毒内消散、桂麝散。

(2) 提脓祛腐药：适用于溃疡初期，脓栓未溶，腐肉未脱，或脓水不净，新肉未生的阶段。常用的有九一丹、八二丹、七三丹、五五丹、九黄丹等。

(3) 腐蚀药与平胬药：适用于肿疡脓未溃时、痔疮、瘰疬、赘疣、息肉等病。常用药物如白降丹，适用于溃疡疮口太小、脓腐难去者；枯痔散一般用于痔疮。腐蚀药一般含有汞、砒成分，腐蚀性较大，在应用时必须谨慎。

(4) 祛腐生肌药：适用于溃疡日久，腐肉难脱，新肉不生；或腐肉已脱，新肉不长，久不收口者。回阳玉龙散用于溃疡属阴证；月白珍珠散、拔毒生肌散用于溃疡阳证；黄芪六一散、回阳生肌散用于溃疡虚证。

(5) 生肌收口药：用于疮疡溃后，脓水将尽，或腐肉已脱、新肉生，收口较慢时，常用药有生肌散、八宝丹等。

(6) 止血药：适用于溃疡或创伤小而出血者。溃疡出血用桃花散，创伤性出血用如圣金刀散，云南白药既可用于溃疡出血，也可用于创伤性出血。

(7) 清热收涩药适用于一切皮肤病急性或亚急性皮炎而渗液不多者。常用的有青黛散、三石散等。

## 6. 酊剂

适用于疮疡未溃及皮肤病等。红灵酒有活血、消肿、止痛之功，用于冻疮、脱疽未溃之时；10%土槿皮酊、复方土槿皮酊有杀虫、止痒之功，适用于鹅掌风、灰指甲、脚湿气等；白屑风酊有祛风、杀虫、止痒之功，适用于面游风。

## 7. 洗剂

三黄洗剂有清热止痒之功，用于一切急性皮肤病，如湿疮、接触性皮炎等；颠倒散洗剂有清热散瘀之功，用于酒齄鼻、粉刺。

## 6. 一切肿疡初起的治法总则是

- A. 消法
- B. 补法
- C. 补托法
- D. 透托法
- E. 药物疗法

**【知识拓展】**消法，托法和补法

1. 消法是运用不同的治疗方法和方药，使初起的肿疡邪毒不致结聚成脓而得到**消散**的治法，是一切肿疡初起的治法总则。此法适用于尚未成脓的初期肿疡和非化脓性肿块性疾病以及各种皮肤性疾病。
2. 托法是用**补益气血**和**透脓**的药物，扶助正气，托毒外出，以免毒邪扩散和内陷的治疗法则。托法适用于外疡中期即成脓期，此时热盛肉腐成脓，由于一时疮口不能溃破，或机体正气虚弱无力托毒外出，均会导致脓毒滞留。治疗上应根据患者体质强弱和邪毒盛衰状况，分为补托和透托两种方法。补托法用于正虚毒盛，正气不能托毒外达，疮形平塌、根脚散漫不收、难溃难腐的虚证；透托法用于毒气虽盛而正气未衰者，可用透脓的药物，促其早日脓出毒泄，肿消痛减。
3. 补法是用补养的药物**恢复其正气**，助养其新生，使疮口早日愈合的治疗法则。此法则适用于溃疡后期。
7. 肿而色红，皮薄光泽，焮热疼痛，肿势急剧的为
  - A. 热肿
  - B. 寒肿
  - C. 风肿
  - D. 湿肿
  - E. 痰肿

**【知识拓展】**

## 辨肿

1. 热肿：肿而色红，皮薄光亮，焮热疼痛，肿势急剧。常见于阳证疮疡，如疔疗初期、丹毒等。
2. 寒肿：肿而不硬，皮色不泽，苍白或紫暗，皮肤清冷，常伴有酸痛，得暖则舒。常见于冻疮、脱疽等。
3. 风肿：发病急骤，漫肿宣浮，或游走无定，不红微热，或轻微疼痛。常见于疔腮、大头瘟等。
4. 湿肿：皮肉重垂胀急，深按凹陷，如烂棉不起，浅则光亮如水疱，破流黄水，浸淫皮肤。常见于股肿、湿疮。
5. 痰肿：肿势软如棉，或硬如馒，大小不一，形态各异，无处不生，不红不热，皮色不变。常见于瘰疬、脂瘤等。
6. 气肿：皮紧内软，按之凹陷，复手即起，似皮下藏气，富有弹性，不红不热，或随喜怒消长。常见于气瘰、乳癖等。
7. 瘀血肿：肿而胀急，病程较快，色初暗褐，后转青紫，逐渐变黄至消退。也有血肿染毒、化脓而肿。常见于皮下血肿等。
8. 郁结肿：肿势坚硬，表面不平或有棱角，状如岩突，不红不热。
9. 实肿：肿势高突，根盘收束，常见于正盛邪实之疮疡。
10. 虚肿：肿势平坦，根盘散漫，常见于正虚不能托毒之疮疡。

## 医师资格考试辅导

8. 下列痒的原因不包括

- A. 气虚
- B. 风胜
- C. 湿胜
- D. 虫淫
- E. 血虚

**【知识拓展】**

辨痒

包括肿疡作痒和溃疡作痒。主要原因有：

1. 风胜走窜无定，遍体作痒，抓破血溢，随破随收，不致化腐，多为干性，如牛皮癣、白疔、瘾疹等。
2. 湿胜浸淫四窜，黄水淋漓，最易沿表皮蚀烂，越腐越痒，多为湿性，如急性湿疮；或有传染性，如脓疱疮。
3. 热胜皮肤瘾疹，焮红灼热作痒，或只发于裸露部位，或遍布全身。甚则糜烂滋水淋漓，结痂成片，常不传染，如接触性皮炎。
4. 虫淫浸淫蔓延，黄水频流，状如虫行皮中，其痒尤甚，最易传染，如手足癣、疥疮等。
5. 血虚皮肤变厚、干燥、脱屑，很少糜烂流滋水，如牛皮癣、慢性湿疮。

9. 灭菌是指

- A. 杀灭细菌
- B. 杀灭病原微生物
- C. 杀灭有害微生物
- D. 杀灭一切活的微生物
- E. 杀灭芽孢类微生物

10. 药物浸泡消毒法中，器械消毒液浸泡的时间为

- A. 20 分钟
- B. 30 分钟
- C. 40 分钟
- D. 50 分钟
- E. 60 分钟

11. 下列属于常用局麻药的是

- A. 苯巴比妥
- B. 肾上腺素
- C. 二甲双胍
- D. 利多卡因
- E. 哌替啶

12. 麻醉并发喉痉挛严重时需注射

- A. 阿托品
- B. 利尿酸
- C. 肾上腺素
- D. 琥珀酰胆碱

E. 以上均非

13. 急性呼吸性酸中毒应最先解决的问题是

- A. 肺部感染，使用大量抗生素
- B. 进行人工呼吸
- C. 应用呼吸中枢兴奋剂
- D. 解除呼吸道梗阻，改善肺换气功能
- E. 给予碱性液体

14. 关于补钾的原则与方法的说法不正确的是

- A. 尽量口服
- B. 补钾应低浓度
- C. 补钾应慢速度
- D. 尿量 $<40\text{ml/h}$  暂不补钾
- E. 静脉补钾每分钟应少于 100 滴

15. 外科输血的适应症中，急性出血的失血量为

- A. 100~300ml
- B. 200~300ml
- C. 300~400ml
- D. 400~500ml
- E. 500~1000ml

16. 需慎重输血的情况不包括

- A. 脑出血
- B. 低蛋白血症
- C. 恶性高血压
- D. 急性肺水肿
- E. 充血性心力衰竭

17. 下列说法中错误的是

- A. 输血操作不当可引起空气栓塞、微聚物和肺栓塞
- B. 输血后可能出现紫癜、非心源性肺水肿
- C. 输血的不良反应不包括细菌污染反应
- D. 大量输血可引起凝血机制紊乱、高钾血症
- E. 枸橼酸盐中毒是输血引起的不良反应

18. 下列属于自体输血禁忌证的是

- A. 有大出血的手术
- B. 出血量在 1000ml 以上的择期手术
- C. 胸腹开放性损伤超过 4 小时
- D. 低温下的心内直视手术
- E. 特殊血型无相应供血者

## 医师资格考试辅导

19. 下列属于自体输血适应证的是

- A. 血液可能有癌细胞的污染
- B. 胸腹开放性损伤超过 4 小时
- C. 心、肺、肝、肾功能不全者
- D. 特殊血型，无相应供血者
- E. 凝血因子缺乏患者

自体输血适应证：

(1) 有大出血的手术和创伤，如胸部创伤、脾破裂及异位妊娠破裂及神经外科、骨科、心血管外科、胸腹部手术等。

(2) 估计出血量在 1000ml 以上的择期手术，如主动脉瘤切除、肝叶切除等。

(3) 血型特殊者（无相应供血者，输血困难）。

(4) 体外循环或低温下的心内直视手术以及其他较大的择期手术与急诊手术，可考虑采用血液稀释法。

本题知识点：自体输血，

20. 外科输血的适应症中，急性出血需要输血时，失血量最少达总血量的

- A. 8%
- B. 10%
- C. 15%
- D. 20%
- E. 25%

21. 一般手术患者禁食、禁水的时间是

- A. 术前 8 小时、4 小时
- B. 术前 12 小时、4 小时
- C. 术前 10 小时、6 小时
- D. 术前 12 小时、6 小时
- E. 术前 6 小时、4 小时

22. 关于术后恶心、呕吐、腹胀、呃逆的处理不正确的是

- A. 予以持续胃肠减压
- B. 高渗液低压灌肠
- C. 压迫眶上缘，针刺内关
- D. 颈部膈神经封闭
- E. 顽固性呃逆，可压迫眶上缘，针刺鸠尾

23. 对于慢性疼痛的药物治疗中，常用于治疗轻度疼痛的药物是

- A. 吗啡
- B. 芬太尼
- C. 可待因
- D. 哌替啶
- E. 阿司匹林

## 医师资格考试辅导

24. 网状淋巴管炎又称

- A. 疔
- B. 痈
- C. 丹毒
- D. 脓肿
- E. 急性蜂窝织炎

25. 深部脓肿的临床表现是

- A. 局部红肿明显
- B. 可扪到波动
- C. 局部水肿，压痛明显，穿刺有脓
- D. 患处无活动障碍
- E. 病程长，发展慢，无红肿热痛

26. 丹毒胎火胎毒证选用的治法是

- A. 散风清热解毒
- B. 清肝泻热利湿
- C. 利湿清热解毒
- D. 凉营清热解毒
- E. 凉营泻火解毒

27. 丹毒的临床表现是

- A. 初起毛囊处有红肿热痛的小结节，逐渐肿大并隆起，数天后中央部组织坏死，出现脓栓
- B. 易向四周及深部浸润发展，周围有浸润性水肿，常有局部淋巴结肿大、疼痛
- C. 呈片状红疹，颜色鲜红，中间较淡，边缘清楚，略为隆起
- D. 红肿热痛等局部症状明显，范围扩大迅速，进而中心坏死、化脓，出现波动感
- E. 局部淋巴结肿大和压痛

28. 治疗颈痛首选

- A. 五味消毒饮
- B. 牛蒡解肌汤
- C. 柴胡清肝汤
- D. 萆薢渗湿汤
- E. 活血散瘀汤

29. 脓性指头炎火毒结聚证用方为

- A. 活血散瘀汤
- B. 托里透毒散
- C. 五味消毒饮
- D. 五味消毒饮合透脓散
- E. 黄连解毒汤合犀角地黄汤

30. 与脑挫裂伤的颅内压增高与脑疝并见的临床表现不包括

## 医师资格考试辅导

- A. 血压升高
  - B. 心率减慢
  - C. 呼吸加深
  - D. 瞳孔等大
  - E. 锥体束征
31. 成人头、颈部全部烧伤，其面积约为全身面积的
- A. 3%
  - B. 6%
  - C. 9%
  - D. 18%
  - E. 20%
32. 闭式胸膜腔引流，引流中液体的穿刺部位一般选在
- A. 腋中线第 6 肋间
  - B. 腋后线第 7 肋间
  - C. 腋中线第 7 肋间
  - D. 腋中线和腋后线之间的第 6~8 肋
  - E. 腋后线第 8 肋间
33. 关于慢性淋巴性甲状腺炎的说法错误的是
- A. 起病缓慢
  - B. 肿块质硬
  - C. 表面光滑
  - D. 肿大两侧多对称
  - E. 以甲状腺两侧叶为显著
34. 关于甲状腺癌的说法不正确的是
- A. 甲状腺肿块
  - B. 压迫症状
  - C. 无家族史
  - D. 转移
  - E. 扩散
35. 乳腺癌早期的常见局部体征是
- A. 凹陷性酒窝征
  - B. 乳房内包块
  - C. 乳头抬高
  - D. 乳头内陷
  - E. 肿块坚硬
36. 下列哪项不属于乳腺癌的症状
- A. 乳房内包块
  - B. 乳头内陷

## 医师资格考试辅导

- C. 乳头部抬高
- D. 乳房肿胀，质地柔软
- E. 包块局部皮肤改变

37. 胃、十二指肠溃疡急性穿孔的症状不包括

- A. 剧烈腹痛
- B. 休克症状
- C. 恶心呕吐
- D. 腹部压痛及腹肌强直
- E. 6~12 小时后体温开始明显上升

38. 原发性肝癌的常见症状不包括

- A. 腹胀
- B. 消瘦乏力
- C. 贫血
- D. 上腹肿块
- E. 纳差

【正确答案】C

【答案解析】肝癌常见症状为肝区疼痛、腹胀、消瘦乏力、纳差、上腹肿块。

本题知识点：原发性肝癌，

39. 门静脉高压症的主要临床表现不包括

- A. 呕血
- B. 腹水
- C. 脾肿大
- D. 肝区疼痛

40. 腹外疝发病原因不包括

- A. 尿频
- B. 排尿困难
- C. 慢性咳嗽
- D. 腹白线发育不良
- E. 肥胖所致肌肉萎缩

41. 下列除哪项外，均是周围血管疾病的体征

- A. 皮肤颜色改变
- B. 游走性血栓性浅静脉炎
- C. 小腿肌肉萎缩
- D. 疼痛
- E. 动脉搏动减弱

42. 一患者皮疹潮红，疱壁紧张，灼热刺痛；伴口苦咽干，心烦易怒，大便干，小便黄；舌质红，苔黄腻，脉滑数，选用的方药是

- A. 龙胆泻肝汤
- B. 除湿胃苓汤

## 医师资格考试辅导

- C. 柴胡疏肝散
- D. 桃红四物汤
- E. 萆薢渗湿汤

43. 慢性淋病选用的治法为

- A. 清热利湿，解毒化浊
- B. 滋阴降火，利湿祛浊
- C. 调和气血，消风通络
- D. 滋补肝肾，养血祛风
- E. 清热利湿，和营通络

## 【A2 型题】

1. 患者女性，28 岁，手术后出现表情淡漠、嗜睡、烦躁、腹胀、心律加快，心电图早期 T 波低平、双相倒置，继之 S-T 段下降、Q-T 间期延长和 U 波出现，属

- A. 轻度脱水
- B. 中度脱水
- C. 重度脱水
- D. 低钾血症
- E. 高钾血症

2. 患者男性，35 岁，出现局部隆起，红肿热痛明显，压之剧痛，有波动感，应首先考虑为

- A. 丹毒
- B. 蜂窝织炎
- C. 脓肿
- D. 疥
- E. 疖

3. 患者女性，55 岁，面部出现有红肿热痛的小结节，逐渐肿大并隆起，出现脓栓，应考虑为

- A. 疖
- B. 痈
- C. 疽
- D. 丹毒
- E. 痰核

4. 患者，男。背部起一肿块，上有粟粒状脓头，肿块渐向周围扩大，脓头增多，色红灼热疼痛；舌红，苔黄，脉滑数。选用的治法为

- A. 和营托毒，清热利湿
- B. 滋阴生津，清热托毒
- C. 补益气血，托毒生肌
- D. 清热利湿解毒
- E. 祛风清热利湿

5. 患者男性，33 岁，伤后伤肢剧烈疼痛，局部肿胀及皮肤张力增高区超过皮肤红斑范围，出现伤口周围皮肤捻发音，应首先考虑为

- A. 狂犬病

## 医师资格考试辅导

- B. 癫痫  
C. 破伤风  
D. 气性坏疽  
E. 化脓性脑膜炎
6. 男性患者，26岁，西医诊断为肝破裂，中医辨证为血脱证，宜用方药  
A. 当归补血汤合参附汤  
B. 复元活血汤  
C. 四物汤  
D. 八珍汤  
E. 补阳还五汤
7. 患者，男，26岁，神志恍惚不清，头痛头晕，呕吐恶心，夜寐不宁，或醒后不省人事，昏沉嗜卧；脉细无力。选用的治法为  
A. 辛香开窍，通闭醒神  
B. 镇心安神，升清降浊  
C. 益气养阴，祛瘀开窍  
D. 益气补肾，养血健脑  
E. 疏肝活血安神
8. 患者，男，汽油烧伤前臂，表皮剥脱，散在水疱，疱皮下创面微湿，红白相间，痛觉迟钝。烧伤深度为  
A. I°  
B. 浅II°  
C. 深II°  
D. III°  
E. IV°
9. 患者，女，26岁，颈部肿大，肿块皮宽质软，伴有神情呆滞，倦怠畏寒，行动迟缓，肢冷，性欲下降，舌淡，脉沉细，选用的治法是  
A. 疏肝解郁，健脾益气  
B. 疏肝补肾，调摄冲任  
C. 疏肝理气，化痰散结  
D. 清肝泻胃，解毒消肿  
E. 清热解毒，消肿排脓
10. 患者，女，40岁，颈部肿大，为无痛弥漫性，甲状腺峡部较显著，两侧对称，肿块质硬，表面光滑，甲状腺功能减退，病初有甲亢表现。应首先考虑的是  
A. 甲状腺机能亢进  
B. 慢性侵袭性甲状腺炎  
C. 慢性淋巴性甲状腺炎  
D. 甲状腺腺瘤  
E. 甲状腺癌

## 医师资格考试辅导

11. 患者，女，38岁，甲状腺肿块坚硬如石，推之不移，局部僵硬，形体消瘦，皮肤枯槁，声音嘶哑，腰酸无力，舌质红，少苔，脉沉细数，诊断为甲状腺肿瘤，治疗首选方剂是

- A. 海藻玉壶汤合逍遥散
- B. 桃红四物汤合海藻玉壶汤
- C. 通窍活血汤合养阴清肺汤
- D. 海藻玉壶汤合神效瓜蒌散
- E. 知柏地黄丸合海藻玉壶汤

12. 患者，女，35岁，西医诊断为乳腺癌，症见两胁胀痛，易怒暴躁，乳房结块如石，舌苔薄黄，舌红有瘀点，脉弦有力，选用的治法是

- A. 疏肝解郁，理气化痰
- B. 调摄冲任，理气散结
- C. 清热解毒，活血化痰
- D. 调理肝脾，益气养血
- E. 疏肝活血，化痰散结

13. 患者，男，38岁，溃疡病史十余年，现出现呕血，有上腹部压痛，实验室检查：血红蛋白及血球压积进行性下降，纤维胃镜检查发现明显的出血部位，对该患者采用的内科紧急处理包括

- A. 应用止血药物
- B. 抗酸抗溃疡治疗
- C. 经胃管注入冰的生理盐水
- D. 经选择性动脉造影栓塞止血
- E. 以上都是

14. 患者女性，29岁，突发右上腹痛，伴恶心、发热，莫菲征阳性，B超胆囊增大，可见双边征，血白细胞升高，应诊断为

- A. 急性单纯性胆囊炎
- B. 急性化脓性胆囊炎
- C. 慢性胆囊炎
- D. 胆囊结石
- E. 急性胰腺炎

15. 患者女性，35岁，转移性右下腹疼痛3天，右下腹压痛、反跳痛、肌紧张，腰大肌试验阳性，血白细胞升高，应诊断为

- A. 急性阑尾炎
- B. 慢性阑尾炎
- C. 急性肠梗阻
- D. 肠系膜淋巴结炎
- E. 右侧附件炎

【正确答案】A

16. 若患者肛门局部红肿灼热，坠胀不适，伴有不同程度的全身症状，易肿、易脓、易溃，但不易敛，溃后易形成肛瘘，应考虑

## 医师资格考试辅导

- A. 血栓性外痔  
B. 肛裂  
C. 肛隐窝炎  
D. 肛周脓肿  
E. 肛周感染
17. 内痔好发于肛门右前、右后和左侧正中部位即膀胱截石位
- A. 1、3、5 点处  
B. 2、5、6 点处  
C. 3、5、7 点处  
D. 3、6、9 点处  
E. 3、7、11 点处
18. 患者，女，40 岁，肛门周围突发肿块，疼痛剧烈，局部红肿灼热。应首先考虑的是
- A. 肛痿  
B. 直肠肛管周围脓肿  
C. 直肠息肉  
D. 肛隐窝炎  
E. 内痔
19. 形成结石的主要因素是
- A. 尿中晶体过多  
B. 晶体聚合抑制物质减少  
C. 成核基质的存在  
D. 以上都是  
E. 以上均非
20. 前列腺增生症最重要的症状是
- A. 尿潴留  
B. 尿频  
C. 进行性排尿困难  
D. 血尿  
E. 尿痛
21. 患者，男，32 岁，尿频、尿急、尿痛，尿道灼热感，排尿不利，尿末或大便时滴白，会阴、少腹、睾丸、腰骶坠胀疼痛；伴发热、恶寒、头身痛楚等；舌红，苔黄腻，脉弦滑，治疗首选
- A. 八正散  
B. 前列腺汤  
C. 柴胡疏肝散  
D. 知柏地黄汤  
E. 济生肾气丸

## 医师资格考试辅导

22. 患者，女，36岁，肾绞痛突然发作，尿液检查可见镜下血尿。应首先考虑的是
- A. 肾结石
  - B. 膀胱结石
  - C. 急性睾丸炎
  - D. 尿道结石
  - E. 肾结核
23. 患者女性，50岁，左下肢有蚯蚓状静脉迂曲，站立时明显，应首先诊断考虑为
- A. 浅静脉炎
  - B. 动脉硬化性闭塞症
  - C. 血栓闭塞性脉管炎
  - D. 下肢深静脉血栓形成
  - E. 下肢静脉曲张
24. 患者，男，46岁，慢性乙肝史8年，肝硬化，门脉高压，突然发生大量呕血，之后出现面色苍白，四肢厥冷，汗出；舌淡，苔白，脉微，选用的治法为
- A. 益气固脱
  - B. 温中健脾，行气利水
  - C. 祛瘀软坚，兼调脾胃
  - D. 益气生津，降逆止呕
  - E. 涤痰化浊，和胃降逆
25. 肠梗阻的典型症状不包括
- A. 腹痛
  - B. 腹胀
  - C. 腹泻
  - D. 呕吐
  - E. 停止排气排便
26. 急性胰腺炎的肝郁气滞证选用的治法为
- A. 疏肝清热，通下利胆
  - B. 清胆利湿，通气通腑
  - C. 泻火解毒，通腑救逆
  - D. 清热泻火，通里逐积
  - E. 疏肝理气，清热燥湿通便
27. 右上腹痛，突发寒战高热，巩膜皮肤黄染，并伴有休克，最可能为
- A. 急性胆囊炎
  - B. 急性胰腺炎
  - C. 黄疸型肝炎
  - D. 壶腹部周围肿瘤
  - E. 急性化脓性梗阻性胆管炎
28. 进食油腻食物后，突发右上腹阵发性绞痛，并向右肩部放射，伴恶心、呕吐，右上腹有

## 医师资格考试辅导

腹膜刺激征，可能为

- A. 急性胆囊炎
- B. 急性胰腺炎
- C. 黄疸型肝炎
- D. 壶腹部周围肿瘤
- E. 急性化脓性梗阻性胆管炎

## 【A3型题】

1. 患者，女，25岁。发现颈前有一肿块，质韧有弹性，表面光滑，边界清楚，无压痛，随吞咽上下移动。辅助检查：血 T32.04nmol/L，T4113.5nmol/L。超声显示：发现一椭圆形肿物，表面光滑，整齐，有包膜，内部为均质低回声区。患者平素易怒，口苦，心悸，失眠多梦，月经不调；舌红，苔薄，脉弦。

1) 首先应考虑的诊断是

- A. 甲状腺功能亢进症
- B. 单纯性甲状腺肿
- C. 甲状腺腺瘤
- D. 甲状腺癌
- E. 慢性淋巴性甲状腺炎

2) 该患者的中医辨证为

- A. 肝郁气滞证
- B. 肝肾亏虚证
- C. 阴虚火旺证
- D. 痰热伤阴证
- E. 气阴两虚证

3) 中医治疗选方为

- A. 知柏地黄丸合海藻玉壶汤加减
- B. 逍遥散合海藻玉壶汤加减
- C. 生脉散合补中益气汤加减
- D. 通窍活血汤合养阴清肺汤加减
- E. 龙胆泻肝汤合藻药散加减

2. 女，32岁，主诉右乳胀痛，与月经周期有关，检查右侧乳房内有多个结节状肿块，边界不清，可推动，有压痛。超声显示右侧乳房增大，边界完整，内部结构紊乱，呈粗大的回声点。伴有心烦易怒，失眠多梦，胸胁胀满。舌质淡红，苔薄白，脉细涩。

1) 首先考虑的诊断是

- A. 乳腺癌
- B. 乳腺纤维腺瘤
- C. 乳腺增生病
- D. 急性乳腺炎
- E. 乳房肉瘤

2) 常用的药物治疗可选

- A. 青霉素、红霉素、头孢类抗生素等
- B. 化学药物治疗

## 医师资格考试辅导

- C. 内分泌疗法
- D. 维生素类药物
- E. 生物治疗

3) 该患者中医治疗原则为

- A. 活血化瘀，软坚祛痰
- B. 行气活血，散瘀止痛
- C. 清热解毒，活血化瘀
- D. 调摄冲任，理气散结
- E. 疏肝理气，散结止痛

3. 患者，男性，72岁。发现右下腹肿物5个月，肿物站立时明显，平卧时可缩小，今晨排便时肿物突然增大，伴疼痛，疼痛逐渐加重，之后有发热、腹胀、恶心、呕吐。晚20点来医院急诊。既往前列腺增生，排尿困难20年。查体：一般情况尚可，生命体征平稳。右腹股沟区肿物，进入阴囊。肿物壁张力高，有压痛。腹部查体无压痛、反跳痛，肠鸣音活跃，有气过水声。

1) 首先考虑的诊断是

- A. 腹股沟直疝
- B. 腹股沟斜疝
- C. 股疝
- D. 腹壁切口疝
- E. 脐疝

2) 腹外疝的疝内容物最多见的是

- A. 盲肠
- B. 阑尾
- C. 大网膜
- D. 膀胱
- E. 小肠

3) 若该患者疝内容物为大网膜，则可见

- A. 包块柔软
- B. 叩诊呈鼓音
- C. 听诊无肠鸣音
- D. 包块回纳进入腹腔时，可听到“咕噜声”
- E. 包块光滑、有弹性

4. 患者，男，34岁，自觉肛门肿胀、疼痛有异物感2周。排便后肛门有突起的肿块，疼痛剧烈，活动受限，甚至坐卧不安。检查可见肛周有暗紫色椭圆形肿块突起，表面水肿。触之质硬，剧痛，不能活动。

1) 首先考虑的诊断是

- A. 内痔Ⅰ期
- B. 内痔Ⅱ期
- C. 血栓性外痔
- D. 结缔组织性外痔
- E. 肛周脓肿

## 医师资格考试辅导

2) 适用于各期内痔、外痔感染发炎及手术后换药的是

- A. 熏洗法
- B. 塞药法
- C. 枯痔法
- D. 外敷法
- E. 冷冻疗法

3) 风伤肠络证的首选方为

- A. 凉血地黄汤或槐花散加减
- B. 脏连丸加减
- C. 止痛如神汤加减
- D. 补中益气汤加减
- E. 青蒿鳖甲汤合三妙丸加减

5. 男, 45 岁, 阵发性右腹绞痛 1 天, 伴恶心呕吐, 无发热, 腹痛发作时向右下腹放射伴尿频、尿痛等症状, 查体腹软, 右下腹有压痛, 无反跳痛, 膀胱区不胀, 血 WBC 正常, 尿常规 WBC0~1 个/HP, RBC7~10/HP。舌暗或有瘀斑, 苔薄白或微黄, 脉弦紧。

1) 最可能的诊断是

- A. 阑尾炎
- B. 肾肿瘤
- C. 急性肾盂肾炎
- D. 肾结核
- E. 输尿管结石

2) 该患者中医辨证为

- A. 湿热蕴结证
- B. 气滞血瘀证
- C. 肾气不足证
- D. 湿热下注证
- E. 火毒炽盛证

3) 对应的选方为

- A. 龙胆泻肝汤加减
- B. 济生肾气丸加减
- C. 八正散加减
- D. 金铃子散合石韦散加减
- E. 仙方活命饮加减

6. 患者男, 87 岁, 因“双足麻木、发凉 6 个月, 右足趾疼痛且呈暗红色 1 个月”来诊。发病期间出现间歇性跛行。有长期吸烟史, 高脂饮食习惯。查体: 足拇趾趾腹可见 2 个 0.5cm × 0.5cm 瘀斑, 双足汗毛脱落, 趾甲增厚、变形, 右小腿汗毛稀疏, 肌肉松弛, 双足背及胫后动脉搏动消失。多普勒超声: 血管弹性差, 周围阻力高, 右下肢供血不足。血液流变学: 全血黏度、血浆黏度、血小板聚集性升高。动脉造影: 右股动脉狭窄、闭塞。

1) 最可能的诊断是

- A. 下肢深静脉血栓形成
- B. 血栓闭塞性脉管炎
- C. 动脉硬化性闭塞症
- D. 动脉栓塞
- E. 下肢静脉曲张

2) 该患者病变闭塞部位在

## 医师资格考试辅导

- A. 髂动脉
- B. 股一胭段动脉
- C. 股-胭静脉
- D. 髂-股静脉
- E. 胫前、胫后

3) 该病的血瘀络证首选方为

- A. 阳和汤加减
- B. 桃红四物汤加减
- C. 补阳还五汤
- D. 四妙勇安汤加减
- E. 八珍汤

7. 男, 57 岁, 右上腹痛 3 个月, 发热 10 天。患者 3 个月前无明显诱因出现右上腹持续性胀痛, 逐渐加重, 10 天前发热, 体温最高达 37.8℃。既往发现 HBsAg (+) 10 年。巩膜轻度黄染胸前可见蛛痣。腹部膨隆, 脐周可见静脉曲张。总胆红素 38.5 μmol/L, 直接胆红素 23.2 μmol/L。AFP412ng/ml。腹部 B 超: 肝右叶近肝门见一大小约 7cm×5.5cm 病变, 边界不清, 内部回声。脘腹胀满, 胁痛肢楚, 神疲乏力, 纳呆便溏, 四肢肿胀; 舌淡胖, 苔白或腻, 脉弦而滑。

1) 首先应考虑的诊断是

- A. 肝炎
- B. 肝硬化
- C. 肝癌
- D. 胰头癌
- E. 慢性胰腺炎

2) 该患者的中医辨证分型为

- A. 气滞血瘀证
- B. 脾虚湿困证
- C. 肝胆湿热证
- D. 肝肾阴虚证
- E. 瘀毒内阻证

3) 对应的方剂应该选择

- A. 小柴胡汤合大黄廑虫丸加减
- B. 滋水清肝饮合兰豆枫楮汤加减
- C. 四君子汤合逍遥散加减
- D. 茵陈蒿汤合鳖甲煎丸加减
- E. 失笑散合膈下逐瘀汤加减

**【B 型题】**

1. 请从以下选项中选择正确答案

- A. 黏膜表面麻醉
- B. 局部浸润麻醉
- C. 区域阻滞麻醉
- D. 神经阻滞麻醉
- E. 硬膜外麻醉

## 医师资格考试辅导

- 1) 适用于各类中小型手术的麻醉是
- 2) 将局麻药注射于神经干的周围，使该神经干所支配的区域产生麻醉，称为

2. 请从以下选项中选择正确答案

- A. 极度口渴，乏力，眼窝明显凹陷
- B. 出现烦躁、谵妄，血压下降乃至休克
- C. 乏力、头昏、手足麻木，但无口渴感
- D. 厌食、恶心、呕吐，脉搏细速，血压不稳定或下降，脉压变小
- E. 肌痉挛性抽痛，病人神志不清，常伴有严重休克

- 1) 重度缺钠的症状是
- 2) 高渗性缺水中度缺水的症状是

3. 请从以下选项中选择正确答案

- A. 停止输血，积极抗休克、维持循环功能、保护肾功能和防治弥散性血管内凝血（DIC）
- B. 保证血源质量，防止血源污染，严格无菌操作
- C. 主要措施为抗休克、抗感染，包括使用广谱抗生素、补液、利尿、降温、纠酸等
- D. 立即停止输血，半坐位，吸氧和利尿
- E. 立即减慢输血速度，严重者停止输血，抑制发热反应的常用药物为解热镇痛药

- 1) 针对输血后的细菌污染反应，应采取
- 2) 针对输血后的溶血反应，应采取

4. 请从以下选项中选择正确答案

- A. 活血散瘀汤
- B. 清暑汤
- C. 五味消毒饮合透脓散加减
- D. 托里消毒散
- E. 黄连解毒汤合犀角地黄汤

- 1) 脓肿火毒结聚证宜用方药为
- 2) 脓肿余毒流注证宜用方药为

5. 请从以下选项中选择正确答案

- A. 清暑汤
- B. 托里消毒散
- C. 防风通圣散
- D. 仙方活命饮
- E. 竹叶黄芪汤

- 1) 治疗蜈蚣疔首选
- 2) 治疗疔病首选

6. 请从以下选项中选择正确答案

- A. 柴胡清肝汤
- B. 五神汤合萆薢渗湿汤
- C. 犀角地黄汤
- D. 清瘟败毒饮

## 医师资格考试辅导

## E. 十全大补汤

- 1) 痢属气血两虚证者，宜用
- 2) 丹毒属湿热化火证者，宜用

## 7. 请从以下选项中选择正确答案

- A. 行气止痛，活血祛瘀
- B. 清热解毒，顺气通腑
- C. 行气活血，化瘀散结
- D. 清营泻热，解毒养阴
- E. 活血祛瘀止痛

- 1) 胰腺损伤热毒内蕴证选用的治法是
- 2) 胰腺损伤热厥证选用的治法是

## 8. 请从以下选项中选择正确答案

- A. 注射破伤风抗毒素
- B. 小肠部分切除吻合术
- C. 小肠修补术
- D. 清创缝合术
- E. 输血补液

- 1) 小肠部分断裂者应采取的治疗措施是
- 2) 小肠单纯穿孔者应采取的治疗措施是

## 9. 请从以下选项中选择正确答案

- A. 苏合香丸
- B. 保立苏汤
- C. 柴胡细辛汤
- D. 琥珀安神汤
- E. 补阳还五汤

- 1) 治疗脑震荡昏迷期首选
- 2) 治疗脑震荡苏醒期首选

## 10. 请从以下选项中选择正确答案

- A. 突发上腹剧烈疼痛，迅速波及全腹
- B. 恶心呕吐
- C. 腹肌强直呈板状
- D. 发热
- E. 腹胀，肠鸣音消失

- 1) 胃十二指肠溃疡急性穿孔的典型体征是
- 2) 可以协助诊断胃十二指肠溃疡穿孔的最典型症状是

## 11. 请从以下选项中选择正确答案

- A. 独参汤
- B. 实脾饮
- C. 丁香散

## 医师资格考试辅导

- D. 麦门冬汤  
E. 膈下逐瘀汤  
1) 门静脉高压症寒湿困脾证选用的方剂为  
2) 门静脉高压症瘀血内结证选用的方剂为

12. 请从以下选项中选择正确答案

- A. 驱蛔承气汤  
B. 桃仁承气汤  
C. 甘遂通结汤  
D. 复方大承气汤  
E. 温脾汤  
1) 治疗肠梗阻气滞血瘀证首选  
2) 治疗肠梗阻肠腑热结证首选

13. 请从以下选项中选择正确答案

- A. 槐花散  
B. 脏连丸  
C. 凉血地黄汤  
D. 止痛如神汤  
E. 补中益气汤  
1) 痔的湿热下注证选用的方剂为  
2) 痔的气滞血瘀证选用的方剂为

14. 请从以下选项中选择正确答案

- A. 八正散  
B. 前列腺汤  
C. 柴胡疏肝散  
D. 知柏地黄汤  
E. 济生肾气丸  
1) 治疗前列腺炎气滞血瘀证首选  
2) 治疗前列腺炎肾阳虚衰证首选

15. 请从以下选项中选择正确答案

- A. 清泻肝火，解毒止痛  
B. 健脾利湿，清热解毒  
C. 理气活血，通络止痛  
D. 祛风除湿，杀虫止痒  
E. 养血润肤，祛风止痒  
1) 带状疱疹之脾虚湿蕴证选用的治法为  
2) 带状疱疹之气滞血瘀证选用的治法为