

中级主管护师考试：《答疑周刊》2022 年第 16 期

1. 【问题】骨盆的平面及径线？

【解答】

平面	径线	概念	正常值
入口平面	前后径 (真结合径)	耻骨联合上缘中点至骶岬上缘正中的距离【医学教育网原创】	11cm
	横径	两侧髂耻线间的最大距离	13cm
	斜径(左右各一)	左骶髂关节至右髂耻隆突间的距离	12.75cm
中骨盆平面	前后径	耻骨联合下缘中点通过两侧坐骨棘连线中点至骶骨下端间的距离	11.5cm
	横径 (坐骨棘间径)	两坐骨棘间的距离,其长短与分娩关系密切【医学教育网原创】	10cm
出口平面	前后径	耻骨联合下缘至骶尾关节间的距离	11.5cm
	横径(坐骨结节间径)	为两坐骨结节内侧缘间的距离,是出口的重要径线	9cm
	前矢状径	耻骨联合下缘至坐骨结节间径中点间的距离	6cm
	后矢状径	骶尾关节至坐骨结节间径中点间的距离【医学教育网原创】	8.5cm

2. 【问题】低钾血症静脉补钾的注意事项？

【解答】

见尿补钾	尿量在 40ml/h 以上补钾
浓度不宜过高	氯化钾浓度一般不超过 0.3%【医学教育网原创】
速度不可过快	成年人静脉滴注不超过 1.5g (不超过 60 滴/分)
总量不可过大	每日补氯化钾 3~6g, 严重缺钾者, 不宜超过 8g/d

3. 【问题】传染病类别及标志颜色？

【解答】

呼吸道隔离	蓝色标志	麻疹、百日咳等
-------	------	---------

消化道隔离	棕色标志	甲肝、伤寒等
严密隔离	黄色标志	鼠疫、霍乱等
接触隔离	橙色标志	破伤风、狂犬病等
血液（体液）隔离	红色标志	乙肝、艾滋病等
脓液（分泌物）隔离	绿色标志	——
结核菌隔离	AFB 隔离，灰色标志	肺结核等

4. 【问题】小儿心功能分级？

【解答】

I 级	仅有心脏病体征，无症状，活动不受限，心功能代偿
II 级	活动量大时出现症状，活动轻度受限【医学教育网原创】
III 级	活动稍多即出现症状，活动明显受限
IV 级	安静休息时也有症状，活动完全受限