

医学教育网主管护师：《答疑周刊》2022年第63期

问题索引：

- 1.【问题】麻疹的传播途径？
- 2.【问题】休克微循环的变化，代偿期，抑制期，失代偿期都是什么表现？
- 3.【问题】小儿惊厥、新生儿破伤风、新生儿缺氧缺血性脑病抽搐时都是用什么药物？
- 4.【问题】小儿体重的计算公式什么？

具体解答：

- 1.【问题】麻疹的传播途径？

【解答】麻疹主要通过空气飞沫传播；[医学教育网原创]密切接触者可经污染病毒的手传播，通过衣物、玩具等间接传播者少见。

- 2.【问题】休克微循环的变化，代偿期，抑制期，失代偿期都是什么表现？

【解答】（1）微循环收缩期（休克代偿期）：毛细血管前括约肌强烈收缩，动静脉短路和直接通道开放，增加了回心血量。随着真毛细血管网内血流量减少，压力降低，血管外液进入血管，[医学教育网原创]一定程度补充了循环血量。

（2）微循环扩张期（休克抑制期）：回心血量进一步减少，血压下降，重要脏器灌注不足，休克进入抑制期。

（3）微循环衰竭期（休克失代偿期）：由于组织缺少血液灌注，细胞缺氧更加严重，加之酸性代谢产物和内毒素的作用，使细胞内溶酶体膜破裂，释放多种水解酶，造成组织细胞自溶、死亡，引起广泛的组织损害甚至多器官功能受损。此期也称为休克失代偿期。

- 3.【问题】小儿惊厥、新生儿破伤风、新生儿缺氧缺血性脑病抽搐时都是用什么药物？

【解答】新生儿缺血缺氧性脑病和新生儿颅内出血首选苯巴比妥。

新生儿破伤风和小儿惊厥首选地西洋。

一般来说, [医学教育 网原创]新生儿选的是苯巴比妥, 只有病情严重, 例如新生儿破伤风时, 选择的是地西洋; 其他时候地西洋适用于年龄较大的孩子。

4.【问题】小儿体重的计算公式什么?

【解答】出生: 体重 (kg) =3.25

3~12 月龄: 体重 (kg) =[年龄 (月) +9]/2

1~6 岁: 体重 (kg) =年龄 (岁) ×2+8

7~12 岁: 体重 (kg) =[年龄 (岁) ×7-5]/2



正保医学教育网

www.med66.com