

医学教育网护士执业资格:《答疑周刊》2023年第29期

问题索引:

1. 【问题】10%葡萄糖酸钙的作用?
2. 【问题】肺癌术后安置什么样的体位?
3. 【问题】肛周脓肿用什么抗生素?

具体解答:

1. 【问题】10%葡萄糖酸钙的作用?

【解答】(1) 静脉注射 10%葡萄糖酸钙——枸橼酸钠中毒。每输入库存血超过 1000ml 时,可遵医嘱给予 10%葡萄糖酸钙或氯化钙 10ml 静脉注射,以补充钙离子,减少低血钙的发生。

(2) 新生儿低钙血症发生惊厥——遵医嘱静脉缓慢注射或滴注稀释的 10%葡萄糖酸钙。

(3) 链霉素过敏反应+青霉素过敏反应——可静脉缓慢推注 10%葡萄糖酸钙(或氯化钙) 10ml,以使钙离子与链霉素络合而减轻中毒症状。

(4) 发生心律不齐时——用 10%葡萄糖酸钙加入在等量 25%葡萄糖溶液内静脉推注。[医学教育网]

(5) 硫酸镁中毒——10%葡萄糖酸钙 10ml 在静脉推注时宜在 3 分钟以上推完,由于钙离子可与镁离子争夺神经细胞上的同一受体,阻止镁离子的继续结合。

2. 【问题】肺癌术后安置什么样的体位?

【解答】肺段切除术或楔形切除术者,尽量选择健侧卧位,以促进患侧肺组织扩张。

一侧肺叶切除者,如呼吸功能尚可,可取健侧卧位,以利于手术侧残余肺组织的膨胀与扩张;如呼吸功能较差,则取平卧位,避免健侧肺受压而限制肺的通气功能。

全肺切除术者,应避免过度侧卧,可采取 1/4 侧卧位,以预防纵隔移位和压迫健侧肺而导致呼吸循环功能障碍。

咯血或支气管瘘管者,取患侧卧位。

3. 【问题】肛周脓肿用什么抗生素？

【解答】直肠肛管周围脓肿：全身应用对革兰氏阴性杆菌敏感的抗菌药物控制感染；条件成熟时应穿刺抽取脓液，并根据药敏结果选择[医学教育网原创]和调整敏感抗菌药物。

