

医学教育网执业西药师：《答疑周刊》2021 年第 24 期

问题索引：

1. 【问题】药物妊娠毒性分级，药物汇总如下。
2. 【问题】哺乳期妇女用药，考点汇总。

具体解答：

1. 【问题】药物妊娠毒性分级，药物汇总如下。

A 级	各种水溶性维生素、正常剂量的脂溶性维生素 A、D、枸橼酸钾、氯化钾
B 级	多数青霉素类和头孢素类药物，多黏菌素 B、红霉素、克林霉素、美洛西林、美罗培南等抗菌药物，阿昔洛韦，降糖药阿卡波糖、二甲双胍、门冬胰岛素，解热镇痛药对乙酰氨基酚，消化系统用药法莫替丁、雷尼替丁、泮托拉唑
C 级	[医学教育网原创]氯霉素、咪康唑、万古霉素、去甲万古霉素、氧氟沙星、环丙沙星、莫西沙星、阿米卡星、利奈唑胺等抗菌药物；更昔洛韦、奥司他韦等抗病毒药；格列吡嗪、罗格列酮、吡格列酮、瑞格列奈等降糖药；奥美拉唑、多潘立酮等消化系统用药；氨氯地平、比索洛尔、美托洛尔等降压药
D 级	伏立康唑、妥布霉素、链霉素、甲巯咪唑、缬沙坦-氨氯地平片、卡马西平；在妊娠中晚期使用的降压药卡托普利、依那普利、比索洛尔、美托洛尔等[医学教育网原创]
X 级	他汀类降脂药；抗病毒药：利巴韦林；激素类：米非司酮、炔诺酮、缩宫素、非那雄胺；沙利度胺、华法林、甲氨蝶呤、米索前列醇、前列腺素 E ₁ 、碘甘油等

2. 【问题】哺乳期妇女用药，考点汇总。

考点	内容
对乳儿安全的药物	青霉素类、大多数头孢菌素类(除了第四代头孢匹罗、头孢吡肟)、碳青霉烯类如亚胺培南-西司他丁
对乳儿影响较	不宜使用大环内酯类、喹诺酮类、磺胺类(促使发生核黄疸)、

大的药物	格列喹酮（引起新生儿黄疸）、氯霉素（灰婴综合征）、口服避孕药（乳儿出现易激惹、尖叫、惊厥；男婴则出现乳房增大）、卡托普利（骨髓抑制）、依那普利（影响肾脏）、抗肿瘤药（抑制造血功能）[医学教育网原创]
------	---

