

问题索引：

1. 【问题】洋地黄类药物作用？
2. 【问题】急性型肾静脉血栓临床表现？
3. 【问题】应用环磷酰胺药物后的不良反应？
4. 【问题】什么是高尿酸血症？
5. 【问题】颅脑疾病术后应用创腔引流作用？

具体解答：

1. 【问题】洋地黄类药物作用？

【解答】洋地黄制剂：最适用于心房颤动伴快速心室率或已知有心脏增大伴左心室收缩功能不全者。洋地黄用于治疗心脏的心衰。适应症：①各种心脏病引起的充血性心力衰竭；②快速性室上性心律失常：心房颤动、心房扑动、房性心动过速、阵发性房室交界区心动过速、反复性心动过速。[医学教育网原创]急性心肌梗死病人 24 小时内不宜应用。

2. 【问题】急性型肾静脉血栓临床表现？

【解答】[医学教育网原创]肾静脉血栓形成分为急性型和慢性型。急性型多见于年轻患者，表现为突发性血尿、腹痛，程度可轻可重，查体脊肋角触痛及肾肿大，病情进展迅速，可导致氮质血症或尿毒症而危及生命。

3. 【问题】应用环磷酰胺药物后的不良反应？

【解答】环磷酰胺不良反应易引起出血性膀胱炎、骨髓抑制、消化道症状、肝功能损害、脱发等[医学教育网原创]。

4. 【问题】什么是高尿酸血症？

【解答】高尿酸血症是嘌呤代谢障碍引起的代谢性疾病，少数病人可以发展为痛风，痛风的临床特点为高尿酸血症、反复发作的痛风性关节炎、痛风石、间质性肾炎，[医学教育网原创]严重者呈关节畸形及功能障碍，常伴有尿酸性尿路结石。

5. 【问题】颅脑疾病术后应用创腔引流作用？

【解答】创腔引流在肿瘤切除后的创腔内放置引流物，放置于头旁枕上或枕边，高度与头部创腔保持一致，以保证创腔内一定的液体压力，可避免脑组织移位，

当创腔内压力升高时，血性脑脊液仍可自行流出。



正保医学教育网

www.med66.com