

医学教育网妇产科主治医师: 《答疑周刊》2022年第43期

妊娠合并心脏病是妇产科主治考试中的重要考点,是妇产科医生必须掌握的知识点。此部分内容知识点较多,掌握起来并不难,应引起重视。

问题索引:

1. 有心脏病的孕妇容易并发心衰的时期?
2. 妊娠早期心衰诊断依据?
3. 妊娠合并心脏病心功能Ⅲ级的孕产妇的处理?

具体解答:

1. 有心脏病的孕妇容易并发心衰的时期?

有心脏病的孕妇容易并发心衰的时期为

- A. 孕 28~30 周
- B. 孕 30~32 周
- C. 孕 32~34 周
- D. 孕 26~28 周
- E. 孕 27~30 周

【正确答案】C

【答案解析】孕 32~34 周是血容量增加的高峰期,也是孕妇最危险的时期,极易发生心力衰竭。

2. 妊娠早期心衰诊断依据?

哪项不是妊娠早期心衰诊断依据

- A. 轻微活动即可出现心悸、气短
- B. 夜间常因胸闷醒来
- C. 肺底部可闻及湿啰音,咳嗽后不消失
- D. 下肢水肿,休息后或晨起减轻
- E. 休息时每分心率超过 110 次,每分呼吸超过 20 次

【正确答案】D

【答案解析】早期心力衰竭的临床表现:①轻微活动后即出现胸闷、心悸、气短;②休息时心率每分钟超过 110 次,呼吸每分钟超过 20 次;③夜间常因胸闷而坐起呼吸,或到窗口呼吸新鲜空气;④肺底部出现少量持续性湿啰音,咳嗽后不消

失。


3. 妊娠合并心脏病心功能Ⅲ级的孕产妇的处理?

妊娠合并心脏病心功能Ⅲ级的孕产妇处理正确的是

- A. 总血容量于妊娠 36~38 周增加达高峰
- B. 应择期剖宫产
- C. 为预防产后出血, 静注麦角新碱
- D. 发生产后出血, 应快速输血
- E. 产时未发生心力衰竭, 产后通常不再发生心衰

【正确答案】B

【答案解析】心脏病孕产妇最危险的时期: 妊娠 32~34 周、分娩期及产褥期最初 3 天内, 心脏负担最重, 是心脏病孕产妇最危险的时期。极易发生心力衰竭。对有产科指征及心功能Ⅲ~Ⅳ 级者, 均应择期剖宫产。



正保医学教育网
www.med66.com