

第十八章 运动系统

第一节 骨折概论

2. 分类中：根据骨折的程度和形态分类：**删除了**“不完全骨折”部分的内容。

(三) 影像学检查中**增加了**“有些部位需拍特殊位置 X 线片，如掌骨和跖骨应拍正位及斜位片，跟骨拍侧位和轴位片”。

第二节 上肢骨折

一、锁骨骨折治疗

增加“固定术后 1 周、2 周需复查固定情况并拍片”

二、肱骨近端骨折

“X 线检查除了正位(或后前位)外,应进行腋间位 X 线拍片。”改为了“X 线检查除了正位(或后前位)外,应进行**穿胸位** X 线拍片。”

四、肱骨髁上骨折

3. 并发症中 (1) 血管损伤中**增加了**“如出现高张力肿胀,手指主活动障碍、被动活动剧烈疼痛,桡动脉搏动难以扪及,手指皮温低、感觉异常,即应确定存在骨筋膜室高压,应紧急手术减压。如已出现“5P”征(无痛、脉搏消失、皮肤苍白、感觉异常、肌麻痹),则为时已晚,即便手术减压也难以避免缺血性挛缩”

第三节 下肢骨折

一、股骨颈骨折

(四) 治疗

“骨折可予下肢皮牵引或胫骨结节骨牵引治疗,同时嘱患者进行股四头肌及踝骨活动,预防静脉血栓”。

原为“骨折可不进行特殊治疗”

(3) 人工关节置换术中：**增加**具体描述“全身状况好的得老年患者。选择全髋关节置换术；对于全身状况差、并发症多、预期寿命短者，选择半髋关节置换术”

二、股骨转子间骨折

(三) 治疗

1. 非手术治疗

“10~12 周后，逐渐扶拐下地活动”

原为“6~8 周”

2. 手术治疗中 增加“内固定方法很多，可采用 Gamma 钉、动力髌螺钉”

五、胫腓骨骨折

(二) 治疗

新增加了

“5. 单纯胫骨干骨折由于有腓骨支撑，多不发生明显移位，石膏固定 10~12 可下地活动。

6. 单纯腓骨干骨折，若不伴有上、下胫腓联合分离，不需特殊治疗，可用石膏固定 3~4 周”

第四节 脊柱、脊髓损伤和骨盆骨折

一、脊柱骨折

(三) 影像学检查

CT 检查

删除了“凡有脊柱中柱损伤或有神经症状者均需做 CT 检查”

(六) 治疗

删除了“手术指征”。

五、股骨头坏死

1. 临床表现

“髋关节活动受限，其中以内旋、屈曲、外旋活动受限最为明显”

原为“内旋及外展”

2. 影像学检查

(1) X线片

增加“股骨头血供中段后 12 小时骨细胞即坏死”“X 线平片的体位主要包括正位和蛙式侧位”

2. 手术治疗

删除“髋关节融合术”部分的内容。

六、颈椎病

(一) 颈椎病的分型及临床表现

2. 脊髓型颈椎病 描述大变

(二) 诊断与鉴别诊断

3. 椎动脉型颈椎病 描述大变

4. 交感型颈椎病 描述大变

第十节 骨与关节感染

一、急性血源性骨髓炎

抗生素治疗

新增“发病 5 天内使用效果好，5 天后则影响疗效”

二、化脓性关节炎

(二) 临床表现及诊断

新增“X 线表现：早期只可见关节周围软组织肿胀阴影。出现骨骼改变的第一个征象为骨质疏松。”

第十一节 骨肿瘤

一、骨肿瘤概论

新增

“保肢手术后的重建方法：①瘤骨骨壳灭活再植术；②异体骨半关节移植术；③人工假体置换术；④异体骨假体复合体”



正保医学教育网
www.med66.com