

医学教育网护士执业资格:《答疑周刊》2022年第56期

问题索引:

1. 【问题】肾源性水肿组织疏松部位是眼睑和颜面部吗?
2. 【问题】缩宫素到底是4~5滴开始滴还是10滴开始滴呢?
3. 【问题】胚胎期造血首先出现在?
4. 【问题】营养性巨幼细胞贫血特异的临床表现是?

具体解答:

1. 【问题】肾源性水肿组织疏松部位是眼睑和颜面部吗?

【解答】肾性水肿,通常以指凹性为主,也就是常说的一按一个坑。通常一开始出现在眼睑,然后是双下肢,最后是全身性水肿。[医学教育网]

心源性水肿的特点为:水肿先从身体的下垂部位开始,逐渐发展为全身性水肿。一般首先出现下肢可凹陷性水肿,以踝部最为明显。

2. 【问题】缩宫素到底是4~5滴开始滴还是10滴开始滴呢?

【解答】缩宫素的静脉使用:将缩宫素2.5U加于0.9%生理盐水500ml内,从4~5滴/分开始静脉滴注并观察反应,根据宫缩的强弱进行调节,通常不超过60滴/分。宫缩间隔2~3分钟,持续40~60秒。若出现10分钟内宫缩超过5次、宫缩持续1分钟以上或胎心率有变化,应立即停止滴注。[医学/教育网]

3. 【问题】胚胎期造血首先出现在?

【解答】在胚胎期24周前,胎肝为主要造血器官。婴儿出生后,肝、脾造血功能迅速停止,红骨髓成为主要造血器官,5~7岁以前的儿童全身骨髓都参与造血。[医学 教育网]

4. 【问题】营养性巨幼细胞贫血特异的临床表现是?

【解答】营养性巨幼细胞贫血是维生素B₁₂和(或)叶酸缺乏,当维生素B₁₂缺乏时,表情呆滞、目光发直、少哭不笑、反应迟钝、嗜睡,智力及动作发育落后,常有倒退现象。严重者可出现震颤,甚至出现抽搐、感觉异常。