

医学教育网护士执业资格:《答疑周刊》2022年第59期

问题索引:

1. 【问题】高渗性脱水时体内液体怎样变化?
2. 【问题】脱水后补液原则为?
3. 【问题】妊娠合并心脏病出现心衰就终止妊娠,那为什么不选剖宫产?
4. 【问题】什么是假临产?

具体解答:

1. 【问题】高渗性脱水时体内液体怎样变化?

【解答】细胞内液显著减少,细胞外液稍减少。

2. 【问题】脱水后补液原则为?

【解答】先快后慢、先浓后淡、先盐后糖、先晶后胶,见尿补钾。

第一天的补液总量包括累计损失量、继续损失量和生理需要量三方面。

1) 补充累计损失量:①定输液量(定量)②定输液种类(定性)③定输液速度(定速)。[医学/教育网]

2) 补充继续损失量。

3) 供给生理需要量

实际补液过程中,对补液量的计算为以上三部分合计,一般轻度脱水约90~120ml/kg,中度脱水约120~150ml/kg,重度脱水约150~180ml/kg。

3. 【问题】妊娠合并心脏病出现心衰就终止妊娠,那为什么不选剖宫产?

【解答】妊娠合并心脏病对有产科指征及心功能III~IV级者,均应择期剖宫产。

近年主张对心脏病产妇放宽剖宫产指征。不宜再妊娠者,可同时行输卵管结扎术。

[医学 教育网]

4. 【问题】什么是假临产?

【解答】假临产的特点:

(1) 宫缩持续时间短(<30秒)且不恒定,间歇时间长且不规律,宫缩强度不

增加;

- (2) 宫缩时宫颈管不缩短, 宫口不扩张;
- (3) 常在夜间出现, 清晨消失;
- (4) 给予强镇静药能抑制宫缩。



正保医学教育网

www.med66.com