

# 口腔主治医师 考点回顾

考点回顾整理，仅供参考！

医学教育网 著

## 《口腔主治医师》考点回顾（2022 年）

根面龋有关的细菌

答案：放线菌

产黑色素的是什么菌

答案：普氏菌属

上颌还是下颌的边缘嵴说法正确的是

答案：上颌第一磨牙（牙合）面的四周由颊（牙合）边缘嵴、舌（牙合）边缘嵴、近中边缘嵴和远中边缘嵴组成。近中边缘嵴短而直，远中边缘嵴稍长。近中颊（牙合）角及远中舌（牙合）角为锐角；远中颊（牙合）角及近中舌（牙合）角为钝角。

下颌第一磨牙（牙合）面：为（牙合）面尖、嵴、窝、沟、斜面最多的牙。近远中径大于颊舌径，外形轮廓略似长方形。（牙合）面的四周由四条边缘嵴围成，颊（牙合）边缘嵴长于舌（牙合）边缘嵴，近中边缘嵴较长且直，远中边缘嵴较短且突。

下颌的髓角

答案：下颌磨牙的髓腔形态：下颌磨牙的髓室呈矮立方形，近远中径 > 颊舌径 > 髓室高度。

1) 颊舌剖面观：舌侧髓角高于颊侧髓角。

2) 近远中剖面观：近舌髓角与远舌髓角高度相近，近颊髓角、远颊髓角和远中髓角较低。

### 什么腺体含脂肪最多？

答案：腮腺

### 表面效果最好的？

答案：丁卡因

### 牙槽嵴定义

答案：牙槽嵴：牙槽窝的游离缘。

牙槽窝：为牙槽突容纳牙根的部分。

牙槽间隔：两牙之间的牙槽骨。

牙根间隔：多根牙各牙根之间的牙槽骨。

### 尼氏征阳性

答案：尼氏征阳性：用棉签揉搓外观正常的牙龈黏膜，黏膜表面可出现水疱或血疱，或使外

观正常的黏膜表层脱落，这种现象称为尼科尔斯基（Nikolsky）征，即尼氏征阳性。

### 口解髓腔的高低

答案：上颌磨牙的髓腔形态：上颌磨牙的髓室似立方形，颊舌径 > 近远中径 > 髓室高度。

- 1) 颊舌剖面观：近中颊侧髓角高于近中舌侧髓角。
- 2) 近远中剖面观：髓室近远中径较颊舌径窄，近中颊髓角高于远中颊髓角。

下颌磨牙的髓腔形态：下颌磨牙的髓室呈矮立方形，近远中径 > 颊舌径 > 髓室高度。

- 1) 颊舌剖面观：舌侧髓角高于颊侧髓角。
- 2) 近远中剖面观：近舌髓角与远舌髓角高度相近，近颊髓角、远颊髓角和远中髓角较低。

### 乳牙的萌出顺序，萌出特点

答案：①在一定的时间内，按照一定的顺序，左右成对萌出；②一般情况下，下颌牙的萌出较上颌同名牙略早；③女性同名牙的萌出略早于男性。

一般情况下，乳牙的萌出顺序为：乳中切牙（Ⅰ）→乳侧切牙（Ⅱ）→第一乳磨牙（Ⅳ）→乳尖牙（Ⅲ）→第二乳磨牙（Ⅴ）。

### 下颌姿势位

答案：下颌姿势位曾称为息止颌位。当头直立位，口腔在不咀嚼、不吞咽、不说话的时候，下颌处于休息状态，上下颌牙弓自然分开，从后向前保持着一个楔形间隙，称为息止（牙合）间隙，也称为自由间隙，约为 2~4mm。此时下颌所处的位置，称为下颌姿势位。

**SIgA 什么组成?**

答案：唾液中抗体的主要类型为分泌型抗体 SIgA。

**最终决定修复者是谁? 患者? 技师? 医务人员?**

答案：医师

**下六断根拔除是涡轮，还是三角挺?**

答案：三角挺

**前牙变色选二氧化锆还是金属烤瓷呢?**

答案：考虑二氧化锆

**牙槽突骨折要不要颌间固定**

答案：不需要颌间固定

**贵金属基底冠最少多少**

答案：0.3mm

**金属烤瓷 金属厚度是多少**

答案：0.5mm

**静脉畸形**

答案：静脉畸形：旧分类称海绵状血管瘤，是由衬有内皮细胞的无数血窦所组成。血窦的大小、形状不一，如海绵结构。窦腔内血液凝固而成血栓，并可钙化为静脉石。

位置深浅不一，如果位置较深，则皮肤或黏膜颜色正常；表浅病损则呈现蓝色或紫色。边界不太清楚，扪之柔软，可以被压缩，有时可扪到静脉石。当头低位时；病损区则充血膨大；恢复正常位置后，肿胀亦随之缩小，恢复原状，此称为体位移动试验阳性。

### 乳牙活髓切断用药

答案：乳牙牙髓切断术(pulpotomy-primary teeth)是在局麻下去除冠方牙髓组织,用药物如甲醛甲酚(formocresol,FC)、硫酸铁、氢氧化钙制剂、矿物三氧化物凝聚体 (mineral trioxide aggregate,MTA) 等处理牙髓创面以保存根部健康牙髓组织的治疗方法。

### 利多卡因的最大量 300 400

答案：利多卡因一次最大用量为 300 ~ 400mg。

### 静脉畸形，说平阳霉素治疗 5 次后，肿块明显缩小，脸上还是蓝紫色，问最后怎么治疗？

答案：静脉畸形可采用激光治疗、硬化治疗和手术治疗，以硬化治疗为主，常用的硬化剂有博莱霉素（平阳霉素）、聚多卡醇（聚桂醇）、无水乙醇等。病损内注射后，血管内皮细胞被破坏，病损组织逐渐纤维化、闭锁，最终缩小或消失。注射时，可暂时压迫周围组织，阻断

血液回流；间隔 3~4 周注射 1 次，硬化剂的选择和注射剂量视病变大小和静脉回流速度而定。

### 舌系带手术的麻醉方式

答案：手术可在局麻下进行，以舌钳或缝线通过舌中央距舌尖约 1.5cm 处，向上牵拉舌尖，使舌系带保持紧张，用刀片或剪刀从舌系带中央垂直切开。切开线从前向后，与口底平行，长度约 2~3cm，或切开至舌尖在开口时能接触到上颌前牙的舌面为止，如有必要可剪断颈舌肌。拉拢缝合横行切开出现的菱形创面，使之成为纵行线状的缝合创口。

### 乳牙活髓切断用麻药，甲醛甲酚可以活髓切断吗，我选了 fc 和氢氧化钙

答案：可以的。但是容易造成牙根吸收，产生半抗原作用，故应用较少。多用氢氧化钙。

### 拔上牙智齿麻醉后不完全麻，原因

答案：进针点位置不对或者是注射点位置不对或者是麻药量不够，或者相应的神经没有完全麻醉

### 3 岁伸舌 w 形状不影响吐舌和发音，是切还是观察

答案：要根据具体的题干条件。一般需要系带切除。

### 科目四考粘膜的有唇部大面积糜烂，然后颊部也开始出现

答案：多形性红斑或者是唇炎或者是天疱疮或者是红斑狼疮

### 5岁小朋友 使用硬化剂1年了 出现纤维化 问有怎么处理

答案：静脉畸形可采用激光治疗、硬化治疗和手术治疗，以硬化治疗为主，常用的硬化剂有博莱霉素（平阳霉素）、聚多卡醇（聚桂醇）、无水乙醇等。病损内注射后，血管内皮细胞被破坏，病损组织逐渐纤维化、闭锁，最终缩小或消失。注射时，可暂时压迫周围组织，阻断血液回流；间隔3~4周注射1次，硬化剂的选择和注射剂量视病变大小和静脉回流速度而定。

### 医生不小心被乙肝注射的针头刺伤，是接触传播么

答案：接触传播

### 打麻药立即肿胀，可以穿刺不？

答案：主要冷敷

### 比色 B1B2 有什么差别

答案：明度 (value)：又称亮度。是指物体反射光线的强弱。孟塞尔系统的明度值由黑至白有0~10共11个梯度。自然牙的明度值一般为4~8。具有相同色调的物体，明度与透明度成反比。



色调 (hue): 又称色相。是颜色的基本特性, 是由物体所反射光线的波长决定的。孟塞尔系统中有 10 种基本的色调: 红 (R)、黄 (Y)、绿 (G)、蓝 (B)、紫 (P) 5 种主要色调以及黄红 (YR)、绿黄 (GY)、蓝绿 (BG)、紫蓝 (PB)、红紫 (RP) 5 种中间色调。每种色调又可分成 10 个等级, 以下还可进一步分级。天然牙的色调一般为黄和黄红, 范围为 6YR~9.3YR。

饱和度 (chroma): 又称彩度。是指色调的深浅, 即色调浓度的高低。饱和度最低为 0 即无色。每种色调可达到的最大饱和度不同。自然牙的饱和度一般为 0~7。

**拔完牙 3 天后还出血, 牙槽骨折什么的, 选的是感染**

答案: 拔牙后出血。

**下颌乳牙哪个牙不容易患龋?**

答案: 下乳切牙

**眶下间隙感染能引起脑膜炎吗?**

答案: 眶下间隙感染会引起颅内感染。

**那个人是上牙槽后神经阻滞麻醉后, 立刻肿起来, 第一问是什么原因引起的, 第二问是此刻**

**怎么处理, 第二问里面答案里面有穿刺抽出血肿, 我感觉这个不能选**

答案：①水肿。②止血、冷敷、酌情给予抗生素。

**单纯疱疹病毒如果扩散全身容易引起什么病**

答案：可导致多种疾病，如龈口炎、角膜结膜炎、脑炎、生殖道感染以及新生儿感染等。

**疱疹性龈口炎**

答案：口腔黏膜任何部位尤其是角化良好的部位均可发生成簇小水疱，似针头大小，特别是

邻近乳磨牙（成人是前磨牙）的上腭和龈缘处更明显。

**眶下间隙感染了，会出现海绵窦血栓性静脉炎吗**

答案：眶下间隙感染可能会引起海绵窦血栓性静脉炎。

**眶下间隙感染引起全身感染。会引起脑膜炎还是脑炎。**

答案：眶下间隙感染可能会引起海绵窦血栓性静脉炎。

**牙齿邻面深龋坏达牙龈下方 1mm 问修复方式：**

A.全冠

B.全冠+牙龈切除

选哪个？

答案：B.全冠+牙龈切除



**牛角钳拔哪科牙？上 6 下 6 还是下 8**

答案：牛角钳拔下 6。

**利多卡因麻醉最大剂量**

答案：利多卡因一次最大用量为 300 ~ 400mg。

**医生用氧化锌糊剂操作 下列可能的操作那题，是不是选根充**

答案：氧化锌糊剂可作为根充糊剂。

**拔下 6 的时候远中根断了，用什么方法拔出？根尖挺，三角挺，弯挺？**

答案：三角挺。

**腮腺手术后需要引流吗**

答案：根据具体创口情况，可以引流。

**乳牙活髓切断可不可以用甲醛甲酚**

答案：可以，但是不常用。常用氢氧化钙。

**危险三角是哪里？**

答案：由口角两侧延至鼻根的区域被称为面部的“危险三角区”。

**活动义齿拔牙后多久可以镶牙**

答案：一般拔牙后 1 个月。

### **眶下间隙感染的并发症**

答案：眶下间隙感染向上可向眶内直接扩散，形成眶内蜂窝组织炎，亦可沿面静脉、内眦静脉、眼静脉向颅内扩散，并发海绵窦血栓性静脉炎。

### **病人拔了大部分牙 经济条件不好 问几个月可以修复**

答案：一般拔牙后 1 个月，可以考虑活动义齿修复。

### **下和神经属于什么神经**

答案：混合神经。

### **舌系带矫正术用什么麻醉**

答案：局部麻醉。

### **牙周的治疗 在口内药效最长的和最短的？凝胶 糊剂 膜片**

答案：凝胶最长。

### **腮腺手术属于什么创口**

答案：口外的属于无菌创口

### **断根二分之一是用牙挺还是根尖嵌**

答案：牙挺

### 藻酸盐胶结剂是什么

答案：藻酸盐材料分为粉剂型和糊剂型两型，前者直的胶结剂为二水硫酸钙，而后者的胶结剂为半水硫酸钙，建议您分别记忆不同剂型对应的胶结剂。

### 藻酸盐印模材与琼脂联合取模，什么原因造成琼脂和藻酸盐分离是藻酸盐放的太晚了还是琼

### 脂凝固了

答案：1、 琼脂印模材硬化后会降低与其藻酸盐印模材的结合力；

2、 藻酸盐印模材硬化几乎不能与印模材结合；

3、 取模部位隔湿不佳，琼脂印模材表面受到唾液、龈沟液的污染；

4、 操作者先在牙面上注射琼脂印模材，然后调拌藻酸盐印模材，这样琼脂印模材会先与藻酸盐印模材硬化，从而导致两者结合不良。

### 前牙邻面龋坏用树脂还是复合体

答案：树脂。

乳牙龋坏（大面积），用什么修复--预成冠

答案：预成冠。

### 乳牙牙根吸收的方向

答案：乳牙牙根吸收特点：乳前牙牙根的吸收常从根尖 1 / 3 的舌侧面开始，由于后继恒牙牙胚向(牙合)面和前庭方向移动，渐达乳牙根的正下方，使乳牙牙根呈横向吸收。有时牙根在唇侧留一薄薄的残片。乳磨牙牙根的吸收自根分叉的内侧面开始，斜面状地吸收。

### 牙周脓肿

答案：急性牙周脓肿发病突然，在患牙的唇颊侧或舌腭侧牙龈形成椭圆形或半球状的肿胀突起。牙龈发红、水肿，表面光亮。脓肿的早期，疼痛较明显，可有搏动性疼痛；因牙周膜水肿而使患牙有“浮起感”，叩痛、松动明显。脓肿的后期，脓液局限，脓肿表面较软，扪诊可有波动感，疼痛稍减轻。

### 既能有效地防龋又不至于发生氟牙症的水氟浓度是

- A、 0.5ppm
- B、 0.7ppm
- C、 1.0ppm
- D、 1.2ppm
- E、 1.5ppm

正确答案:C

下列各项中, 不属于医学道德基本原则的是

- A、不伤害原则
- B、有利原则
- C、保密原则
- D、尊重原则
- E、公正原则

正确答案:C

普鲁卡因加入 1:20 万肾上腺素后, 麻醉时间可延长

- A、5%以上
- B、10%以上
- C、15%以上
- D、20%以上
- E、30%以上

正确答案:D

**牙髓塑化疗法适用于**

- A、乳牙
- B、年轻恒牙
- C、前牙
- D 成人磨牙
- E、根尖未封闭的患牙

正确答案:D

**以下关于理想的根管消毒药应具备的条件，正确的是**

- A、能中和和破坏根管内的毒性物质
- B 能有效地渗透到根管 牙本质小管
- C、较稳定，便于储存
- D 不干扰细菌的培养过程
- E、以上描述均正确

正确答案:E

**氟化氨银使用于抗牙本质过敏时，在牙面涂**



- A、30 秒
- B、1 分钟
- C、15 分钟
- D、2 分钟
- E、10 秒

正确答案:D

**复方氯己定含漱剂的组成是**

- A、氯己定+甲硝唑
- B、氯己定+土霉素
- C、氯己定+金霉素
- D、氯己定+四环素
- E、氯己定+碘仿

正确答案:A

**与烤瓷冠桥牙本质和切端层中出现气泡无关的因素是**

- A 在瓷粉混合时有杂质

- B、烧烤时升温速度过快，抽真空速率过慢
- C 不透明层有气泡
- D、牙本质层瓷层过厚
- E、烤瓷炉密封圈处有异物，影响真空度

正确答案:D

**钴铬合金全冠抛光所用抛光剂是**

- A、氧化铁
- B、氧化铬
- C、硼砂
- D、浮石
- E、石膏

正确答案:B

**种植体界面化学的特性主要取决于**

- A、金属本身的性质
- B、金属氧化层的性质

- C、种植体表面的吸附现象
- D 种植体表面的解吸附现象
- E、金属表面成分

正确答案:B

**磷酸锌水门汀应用于牙体缺损的垫底和修复体粘结是因为**

- A、对牙髓无刺激
- B、不溶于唾液
- C、该物质可导电
- D、可渗入牙体和修复体细微结构中，形成一定机械嵌合力
- E、该物质可导热

正确答案:D

**将配制的过饱和二水硫酸钙溶液置于密闭的蒸气压力锅中，在 135~145℃，0.2~0.3MPa**

**压力下处理，得到**

- A、生石膏
- B、熟石膏

- C、普通人造石
- D、超硬石膏
- E、普通人造石及超硬石膏

正确答案:D

**下列水门汀中在充填后表面需涂上凡士林或防水剂的是**

- A、氧化锌丁香酚水门汀
- B、磷酸锌水门汀
- C、聚羧酸锌水门汀
- D、氢氧化钙水门汀
- E、玻璃离子水门汀

正确答案:E

**有关硅橡胶印模材料的描述，下列正确的是**

- A、有良好的弹性、韧性，强度高，能反复灌注无数副模型
- B、制取的印模精度较差，主要用于制取全口印模
- C、加成型硅橡胶比缩合型性能更好

D、 是一种可反复使用的弹性可逆性印模材料

E、 化学稳定性和抗老化性能差

正确答案:C

**具有弹性和可逆性的印模材料是**

A、 藻酸盐类

B、 琼脂

C、 聚醚橡胶

D、 印模膏

E、 硅橡胶

正确答案:B

**琼脂印膜材料的凝固原理为**

A、 离子交换变化

B、 物理温度变化

C、 化学变化

D、 物理压力变化



E、聚合变化

正确答案:B

**RNA 的生物合成-转录是**

A、在 RNA 多聚酶的作用下，以 RNA 为模板合成 RNA 的过程

B、在 RNA 多聚酶的作用下，以 DNA 为模板合成 RNA 的过程

C、在 DNA 多聚酶的作用下，以 RNA 为模板合成 RNA 的过程

D、在 DNA 多聚酶的作用下，以 DNA 为模板合成 RNA 的过程

E、在 DNA 和 RNA 多聚酶的作用下，以 DNA 为模板合成 RNA 的过程

正确答案:B

**骨单位中心为哈弗管，直径为**

A、1~20um

B、20~100um

C、20~100nm

D、100~200nm

E、200~300um



正确答案:E

**口腔常见的变态反应性疾病不包括**

- A、牙周病
- B、唇血管神经性水肿
- C 药物过敏性口炎
- D、急性牙髓炎
- E、过敏接触性口炎

正确答案:AD

**按 Black 窝洞分类第 IV 类洞为**

- A、开始于窝沟的洞
- B、后牙邻面洞
- C 前牙邻面洞不包括切角
- D、前牙邻面洞包括切角
- E、牙齿唇、颊或舌面颈 1/3 的洞

正确答案:D

**窝洞制备时洞缘曲线要求圆钝，其目的是防止**

- A、牙组织折裂
- B、充填体折裂
- C、充填体脱落
- D、继发龋发生
- E、材料的刺激性

正确答案:A

**在口腔疾病中发病率占首位的是**

- A、牙周病
- B、牙髓病
- C、根尖病
- D、龋病
- E、口腔黏膜病

正确答案:D

**龋齿与氟斑牙的鉴别要点是**



- A、 牙面的光泽度
- B、 牙面颜色改变
- C、 发生牙位多少
- D、 有无釉质缺损
- E、 有无地区因素

正确答案:E

**常见的发育障碍和缺陷有**

- A、 额外牙
- B、 先天性缺牙
- C、 牙大小形态异常
- D、 舌形态异常
- E、 以上都是

正确答案:E

**白血病所致的牙龈增生肿大是因为**

- A、 牙龈结缔组织本身增生

B 牙龈成纤维细胞数目剧增、肥大

C、大量幼稚白细胞浸润

D、牙龈炎症性肿大

E、服药所致

正确答案:C

**牙周病的始动因子是**

A、牙石

B、菌斑

C、软垢

D、食物嵌塞

E、(牙合)创伤

正确答案:B

**侵袭性牙周炎典型好发的牙齿部位是**

A、上颌切牙

B、下颌切牙

- C、双尖牙
- D、第一恒磨牙与上、下切牙
- E、双尖牙与上下切牙

正确答案:D

**恒牙迟萌的原因中与遗传性因素有关的因素是**

- A、牙根弯曲阻生埋伏
- B、多生牙、牙瘤、囊肿
- C、乳牙滞留
- D 颅骨锁骨发育不全
- E、先天性甲状腺分泌缺乏

正确答案:D

**白塞病的口腔黏膜损害是**

- A、白色斑块
- B、白色网纹
- C、复发性口腔溃疡



D、大面积糜烂

E、萎缩性舌炎

正确答案:C

**斯一约综合征除口腔黏膜损害，还伴有**

A、眼干、关节痛

B、眼睛、鼻腔、肛门、生殖器的黏膜损害

C、引流区淋巴结肿大，肺部阴影

D、正常皮肤出现大小不等的水疱

E、皮肤靶形红斑多见于四肢

正确答案:B

**关于窝洞预备时保留健康牙体组织的要求，说法正确的是**

A、窝洞作最大程度扩展，避免继发龋产生

B、龈缘尽量位于牙龈边缘的龈方

C、预备时尽量做预防性扩展

D、颊舌径预备时作小程度的扩展

E、牙髓方向尽量预防性扩展

正确答案:D

**龋齿脱矿的部位最早表现在**

A、釉质表层

B、釉质表层下

C、釉质深层

D、釉牙本质界

E、釉牙骨质界

正确答案:B

**不是氟牙症临床表现的为**

A、 表现在同一时期萌出的釉质上

B、对酸的耐受性差，对摩擦的耐受性强

C、严重者有骨骼的增生性变化 估分直播中

D、多见于恒牙

E、严重者伴有釉质的实质缺损

正确答案:B

**牙内陷中最轻的类型是**

- A、畸形舌侧窝
- B、畸形根面沟
- C、畸形中央尖
- D、畸形舌侧尖
- E、牙中牙

正确答案:A

**易与三叉神经痛混淆的是**

- A、急性牙髓炎
- B、慢性牙髓炎
- C、慢性根尖周炎
- D、牙本质敏感症
- E、急性牙乳头炎

正确答案:A

**下列哪项不是慢性龈缘炎的临床表现**

- A、 牙龈充血肿胀
- B、 探诊龈沟出血
- C、 龈沟深度超过 3mm
- D、 牙周附着丧失
- E、 无牙槽骨吸收

正确答案:D

**不会造成牙槽骨快速吸收的是**

- A、 骨质疏松
- B、 牙周病
- C、 猖獗龋
- D、 全身健康状况差
- E、 义齿设计制作不合理

正确答案:C

**观察早期牙槽骨嵴顶吸收情况，最恰当的 X 线片为**

- A、根尖片
- B、牙齿的标准定位片
- C、(牙合)翼片
- D、全口牙位曲面体层 X 线片
- E、水平投照片

正确答案:C

**复杂袋是指**

- A、骨上袋
- B、骨下袋
- C 螺旋形牙周袋
- D、复合袋
- E、假性牙周袋

正确答案:C

**儿童吮指习惯的诊断性标志是**

- A、牙弓狭窄





- B、上颌前突
- C、开唇露齿
- D、后牙反(牙合)
- E、手指上有胼胝

正确答案:E

**乳牙常见的萌出顺序为**

- A、A→B→C→D→E
- B、A→B→D→C→E
- C、A→B→C→E→D
- D、A→B→D→E→C
- E、A→C→B→D→E

正确答案:B

**艾滋病患者口腔特征性表现为**

- A、白念感染、疣状白斑、卡波西肉瘤
- B、口腔溃疡、白念感染、口腔鳞癌

- C、白念感染、毛状白斑、血管瘤
- D、白念感染、毛状白斑、卡波西肉瘤
- E、贫血、口腔溃疡、坏死性龈炎

正确答案:D

婴儿出生后,啼哭拒食,口腔黏膜出现微突的白色绒膜,自行撕去露出渗血的糜烂面多系 A、

白斑

- B、扁平苔藓
- C、雪口病
- D、球菌性口炎
- E、角化上皮珠

正确答案:C

以下疾病中不属于口腔超敏反应性疾病的是

- A、血管神经性水肿
- B、接触性口炎
- C、莱氏综合征

D、斯-约综合征

E、Riga-Fede 病

正确答案:E

**氟化物防龋作用机制是**

A、降低釉质的脱矿

B、抑制细菌摄入葡萄糖

C、抑制细菌产酸

D、促进釉质再矿化

E、以上均正确

正确答案:E

**在初级口腔预防保健中，口腔自我保健方法中没有**

A、刷牙

B、漱口

C、牙周洁治

D、牙龈按摩



E、牙间清洁

正确答案:C

**中厚皮片的厚度是**

A、0.1mm

B、0.2~0.25mm

C、0.8~1.0mm

D、0.35~0.8mm

E、1.2~1.5mm

正确答案:D

**面部软组织擦伤的特点中，错误的是**

A、皮肤全层破损，累及皮下层

B、少量出血

C、创面常附着泥沙等异物

D、剧烈疼痛

E、愈合是以结痂的方式



正确答案:A

唾液腺炎最常见于

- A、腮腺
- B、下颌下腺
- C、舌下腺
- D、腭腺
- E、唇腺

正确答案:A

