

医学教育网主管护师:《答疑周刊》2023年第5期

问题索引:

1. 【问题】苯妥英钠和苯巴比妥的区别?
2. 【问题】内囊出血所致的对侧肢体三偏综合征和脑桥出血所致的交叉瘫痪的区别?
3. 【问题】烧伤面积的计算?

具体解答:

1. 【问题】苯妥英钠和苯巴比妥的区别?

【解答】苯妥英钠片和苯巴比妥都是常用的抗癫痫药物。

	优点	缺点
苯巴比妥 (鲁米那)	抗癫痫作用明显,价格便宜易于在农村和偏远地区使用。	长期服用苯巴比妥可能会导致儿童患者的行为障碍,如不安及多动,苯巴比妥可能对患者的机敏性、注意力、空间思维及记忆力带来不同程度的损害。服用后可能造成困倦、嗜睡,影响日常生活
苯妥英钠	最大的特点是服用后不会引起病人困倦,抗癫痫的作用很强,作用谱也很广,不仅全身性癫痫其对部分性癫痫的效果也很好	可能对肝肾功能造成影响,引起毛发及齿龈增生等。过量服用会出现中毒反应,病人走路不稳,眼球震颤,共济失调等症状

2. 【问题】内囊出血所致的对侧肢体三偏综合征和脑桥出血所致的交叉瘫痪的区别?

【解答】偏瘫、偏身感觉障碍、偏盲叫三偏综合征。它是内囊出血的典型症状。

- (1) 偏瘫: 病变脑组织对侧肢体瘫痪。
- (2) 偏身感觉障碍: 病灶对侧肢体感觉减退或消失。

(3) 偏盲: 病灶对侧同向偏盲, 比如病灶在右侧内囊, 则左眼外侧一半及右眼内侧一半看不见。

交叉性瘫痪——表现为病变侧脑神经麻痹和对侧肢体的瘫痪。

### 3. 【问题】烧伤面积的计算?

**【解答】**中国新九分法: 将人体按体表面积划分为 11 个 9% 的等份, 另加 1%, 构成 100%。适用于较大面积烧伤的评估, 可简记为: 3、3、3 (头、面、颈), 5、6、7 (双手、双前臂、双上臂), 5、7、13、21 (双臀、双足、双小腿、双大腿), 13、13 (躯干), 会阴 1。

部位	成人各部位面积 (%)	小儿各部位面积 (%)
头颈	$9 \times 1 = 9$ (头部 3 面部 3 颈部 3)	$9 + (12 - \text{年龄})$
双上肢	$9 \times 2 = 18$ (双手 5 双前臂 6 双上臂 7)	$9 \times 2$
躯干	$9 \times 3 = 27$ (腹侧 13 背侧 13 会阴 1)	$9 \times 3$
双下肢	$9 \times 5 + 1 = 46$ (双臀 5 双大腿 21 双小腿 13 双足 7)	$46 - (12 - \text{年龄})$

成人烧伤面积口诀:

三三三五六七

十三, 十三, 二十一

双臀占五会阴一

小腿十三双足七

解释:

发、面、颈部均是 3, 双手、双前臂、双上臂是 567;

躯干前、躯干后、双大腿是 13、13、21;

双小腿是 13, 双足是 7。

记忆时, 一边念口诀, 一边用双手触摸身体部位, 非常有用。